

Tabelle 1 | Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2023

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren								
		6	2	3	4	5–10	11 ^{a*}	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60
		U4				U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1			J2	
Rotaviren		G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus ^b			G1		G2		G3 ^c												
Diphtherie ^b			G1		G2		G3 ^c												
Pertussis ^b			G1		G2		G3 ^c												
Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b			G1		G2		G3 ^c												
Poliomyelitis ^b			G1		G2		G3 ^c												
Hepatitis B ^b			G1		G2		G3 ^c												
Pneumokokken ^b			G1		G2		G3 ^c												
Meningokokken C								G1											
Masern								G1	G2										
Mumps, Röteln								G1	G2										
Varizellen								G1	G2										
HPV – Humane Papillomviren										G1 ^d	G2 ^d								
Herpes zoster																		G1 ^h	G2 ^h
Influenza																		S (jährlich)	

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)

A Auffrischung

S Standardimpfung

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich

e Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

f Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff

h Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

***** Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden